

Informovaný souhlas s léčbou alergenovou imunoterapií

Vážená paní, vážený pane,

Váš odborný lékař Vám doporučil léčbu nazývanou alergenová imunoterapie (jiné názvy se kterými se můžete setkat – alergenová vakcinace, hyposenzibilizace, desenzibilizace). Jedná se o léčbu dlouhodobou a pro její úspěšnost je nutné, abyste s lékařem po celé období úzce spolupracoval/a.

Léčba spočívá v injekčním podávání přesně stanovených dávek alergenu, na který jste přecitlivělý/á, v přesně stanovených intervalech. Alergen je podáván podkožně, aplikace je téměř nebolestivá. V úvodní fázi léčby se zvyšuje dávka a koncentrace alergenu až do dávky udržovací, která se pak opakovaně podává (obvykle v intervalu 4-6 dnů) nejméně po dobu 3 let, což je nezbytné k dosažení žádoucího efektu léčby.

Léčebný alergen je upraven tak, aby u Vás nevyvolával žádné obtíže, naopak, úspěšná léčba vede obvykle již po prvním roce ke zmírnění alergických příznaků.

Vzhledem k tomu, že se jedná látku, na kterou jste alergický/á, nelze však ani při správném postupu zcela vyloučit vyvolání nežádoucí reakce. Většinou je jen mírné intenzity a není důvodem k ukončení dlouhodobé léčby. Reakce může vzniknout časně po aplikaci dávky vakcíny (časná reakce) nebo s odstupem několika hodin (pozdní reakce, obvykle pouze místní zduření a bolestivost v místě vpichu).

Pro Vaši bezpečnost je nutné dodržovat následující pokyny lékaře a zdravotní sestry

1. Před podáním injekčního alergenu je nutné oznámit:

- Případnou pozdní reakci po předchozím injekčním podání alergenu (výraznou přetrvávající reakci v místě podání alergenu, zhoršení Vám známých alergických obtíží, výskyt nově vzniklých příznaků).
- Změnu zdravotního stavu, i když nesouvisí s vlastním alergickým onemocněním (infekční onemocnění, jakékoli jiné zdravotní obtíže, nově užívané léky, u žen menstruační potíže, graviditu atp.).
- Plánovaná nebo prodělaná očkování.

2. Po podání injekčního alergenu je nezbytně nutné setrvat 30 min. v klidu pod lékařským dohledem.

- Případné obtíže (*svědění pokožky, kopřivka, kýchání, vodnatá rýma, svědění spojivek, kašel, dušnost, pocit slabosti apod.*) je nutné neprodleně hlásit zdravotní sestře.
- V den podání injekčního alergenu se vyvarujte výraznější fyzické námaze, požití alkoholických nápojů, sprchování horkou vodou.
- Pro úspěšný průběh léčby Vám doporučujeme dodržovat lékařem stanovené intervaly podání alergenu. V případě odkladu plánovaného termínu (např. pro akutní onemocnění) se domluvte o dalším postupu s ošetřujícím lékařem.

Potvrzuji, že jsem byl/a svým odborným lékařem seznámen/a se zásadami alergenové imunoterapie a byl/a jsem upozorněn/a na možná rizika, která jsou s léčbou spojena. Se způsobem léčby souhlasím.

Dne:

Podpis pacienta:.....